



tovarna zdravil, d. d.  
Novo mesto  
Slovenija

## NAVODILO ZA UPORABO

### ***Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!***

- Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 3 dneh, morate obiskati zdravnika.

### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje
3. Kako jemati zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje
6. Dodatne informacije

**Neoseptolet z okusom divje češnje** pastile 1,2 mg  
cetylpyridinii chloridum

### **antiseptik za usta in žrelo**

- Zdravilna učinkovina je cetilpiridinijev klorid.
- Pomožne snovi so tekoči maltitol, maltitol, manitol, levomentol, eterično olje limone, glicerol, deviško ricinusovo olje, brezvoden koloidni silicijev dioksid, magnezijev stearat, povidon, farmacevtski voski (čebelji vosek, karnauba vosek, šelak), titanov dioksid (E171), aroma divje češnje, naravno rdeče barvilo (karmínska kislina (E120), natrijev hidroksid, citronska kislina).

### ***Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec:***

**KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija**

## **1. KAJ JE ZDRAVILO NEOSEPTOLETE Z OKUSOM DIVJE ČEŠNJE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Ena pastila vsebuje 1,2 mg cetilpiridinijevega klorida.

Na voljo so škatle po 18 pastil. Opremljene so z 2 pretisnima omotoma po 9 pastil. Pastile so vijolične barve, okrogle rahlo izbokle.

Neoseptolet z okusom divje češnje delujejo lokalno protimikrobno. Vsebujejo antiseptik cetilpiridinijev klorid, ki uničuje vrsto bakterij in glivic, v določeni meri pa zavira tudi razvoj virusov. Pastile razkužujejo ustno votlino in žrelo in na ta način blažijo vnetja v ustih in žrelu, predvsem pa preprečujejo razvoj hujših bakterijskih vnetij. Cetilpiridinijev klorid zaradi dobre omočljivosti in majhne površinske napetosti prodira tudi na težko dostopna mesta sluznice ust in žrela ter zavira rast bakterij.

Neoseptolet z okusom divje češnje so prijetnega osvežilnega okusa po divji češnji. Ne vsebujejo sladkorja, ki ga bakterije potrebujejo za rast, zato ne kvarijo zob, učinek antiseptika pa je v brezsladkorni osnovi neprimerno boljši.

Pastile priporočamo:

- za lokalno zdravljenje blažjih okužb v ustni votlini in žrelu (faringitis, laringitis, začetek angine),
- pri simptomih prehlada in gripe, kot so skelenje in praskanje v žrelu,
- pri vnetju dlesni in ustne sluznice (stomatitis, gingivitis),
- pri hripavosti in slabem zadahu.

## **2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO NEOSEPTOLETE Z OKUSOM DIVJE ČEŠNJE**

**Ne jemljite zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje:**

- če ste preobčutljivi za cetilpiridinijev klorid ali katerokoli sestavino Neoseptolet z okusom divje češnje.

**Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje:**

- če imate odprte rane v ustih, ker cetilpiridinijev klorid upočasni celjenje ran;
- če imate hujšo okužbo z visoko vročino, glavobolom in bruhanjem, obiščite zdravnika, še posebno, če se težave ne izboljšajo po treh dneh;
- če ste diabetik, morate vedeti, da vsaka pastila vsebuje okrog 1 g maltitola. Zaradi počasne hidrolize in absorpcije v prebavilih maltitol le malo vpliva na raven krvnega sladkorja.
- če imate kronični kašelj in ste hripavi, se morate posvetovati z zdravnikom.

*Prosimo, posvetujte se z zdravnikom tudi, če so se gornje navedbe nanašale na vas kadarkoli v preteklosti.*

Jemanje večjih odmerkov od predpisanih ni priporočljivo.

Pastil ne priporočamo otrokom, mlajšim od 4 let.

**Jemanje zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje skupaj s hrano in pijačo**

Pastil ne jemljite neposredno pred obrokom in hkrati z mlekom.

### **Nosečnost**

*Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.*

O varnosti zdravila med nosečnostjo ni dovolj podatkov, zato jemanja v tem obdobju ne priporočamo.

### **Dojenje**

*Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.*

O varnosti zdravila med dojenjem ni dovolj podatkov, zato jemanja v tem obdobju ne priporočamo.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Ni znano, da bi Neoseptolet z okusom divje češnje vplivale na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

### **Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje**

Pastile vsebujejo naravno barvilo, zato lahko na svetlobi sčasoma posvetlijo.

Pastile vsebujejo maltitol. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo zdravila posvetujte s svojim zdravnikom.

Polioli (maltitol, manitol) lahko v velikih odmerkih povzročijo drisko.

Glicerol v velikih odmerkih lahko povzroči glavobol in prebavne motnje.

### **Jemanje drugih zdravil**

*Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.*

Ni znano, da bi Neoseptolet z okusom divje češnje vplivale na učinke drugih zdravil.

Uporaba površinsko aktivnih anionov (npr. zobna pasta) zmanjša učinkovitost cetilpiridinijevega klorida.

### **3. KAKO JEMATI ZDRAVILO NEOSEPTOLETE Z OKUSOM DIVJE ČEŠNJE**

*Natančno upoštevajte navodilo. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.*

Običajni odmerek za odrasle in otroke, starejše od 12 let, je 8 pastil na dan. Po 1 pastilo raztopite v ustih vsake 2 do 3 ure.

Otrokom od 4. do 10. leta starosti priporočamo do 4 pastile na dan, otrokom od 10. do 12. leta starosti pa do 6 pastil na dan. Po 1 pastilo raztopite v ustih vsake 3 do 4 ure.

Pastil ne jemljite neposredno pred ali med obrokom.

*Če menite, da je učinek Neoseptolet z okusom divje češnje premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.*

#### **Če ste vzeli večji odmerek zdravila Neoseptolet z okusom divje češnje, kot bi smeli**

*Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.*

Glede na količino učinkovin v eni pastili je možnost prevelikega odmerjanja zelo majhna. Zaužitje večje količine pastil lahko povzroči želodčno-črevesne težave, slabost, bruhanje in drisko. V takem primeru prenehajte z jemanjem, popijte veliko vode ali mleka in se posvetujte s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

#### **Če ste pozabili vzeti zdravilo Neoseptolet z okusom divje češnje**

*Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.*

### **4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI**

*Kot vsa zdravila imajo lahko tudi Neoseptolet z okusom divje češnje neželene učinke.*

Če upoštevate priporočene odmerke, se neželeni učinki pojavijo le redko. Pri občutljivih ljudeh jemanje večjih odmerkov od predpisanih lahko povzroči želodčno-črevesne težave zaradi draženja sluznice prebavil. Zelo redko se lahko pojavijo znaki preobčutljivosti za zdravilo.

*Če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.*

### **5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA NEOSEPTOLETE Z OKUSOM DIVJE ČEŠNJE**

*Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!*

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C, zaščiteno pred svetlobo in vlago.

Shranjujte v originalni ovojnini.

#### **Rok uporabnosti**

*Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.*

#### **Način izdajanja zdravila**

*Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.*

#### **Datum zadnje revizije**

20. 10. 2005

### **6. DODATNE INFORMACIJE**

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.

KRKA, tovarna zdravil, d. d.  
Šmarješka cesta 6  
SI-8501 Novo mesto  
info@krka.biz

**Navodilo je bilo odobreno**  
18. 11. 2005

O-4564